

幼
幼
新
書

幼幼新書卷第十七

寒熱瘧瘴

凡廿二門

後學古吳陳履端于始輯

長洲趙起鳳伯羽校

痰實第一

巢氏云兒飲乳冷熱不調停積胃膈間結聚成痰多則飲乳不下吐涎沫變結而微壯熱不止發驚癇千金治痰實結聚宿癖羸露不能飲食真珠丸

真珠

兩半

麥門冬

兩一

麝仁

去皮二百粒

巴豆

枚卅

末蜜丸碁兒二丸如小豆二百日如麻子漸增

知為度下赤黃白黑葵汁病盡自止久服肥白

治熱結痰實不食

芍藥

梔子

知母

大黃

各二兩

柴胡

二兩六銖

升麻

黃連

黃芩

各二兩半

竹葉

切升半

桔梗

兩半

細辛

銖十五

呔咀水六升煮升八合分四服十歲作三服外臺

有枳實杏仁各兩半無桔梗黃連

經驗治痰實久癰纏喉風輟嗽遍身風疹急中涎潮

等此不大吐只出涎

瓜蒂

不拘多少

細末壯年一字十五以下氣怯半字早晨并藥水下須含砂糖一塊良久涎出年深涎盡有一塊布水上如鑑涎盡食粥一二日吐多困甚即細研麝溫水調嚥止

聖惠陳橘皮散治痰壅結實欲嘔

陳橘皮

焙去白

桑白皮

麥門冬

焙各半兩

川大黃

炒

前胡

川升麻

各一分

粗散一錢水一盞煎五分不時量溫服

治痰實心胃不利欲嘔前胡散

前胡

半兩

貝母

煨

白朮

桑白皮

人參

各一分

陳橘皮

去白焙半兩

粗散一錢水一盞煎五分不時溫服

芒硝丸治痰實往來寒熱不飲食肌體羸瘦

川芒硝

川大黃

炒

代赭

各半兩

半夏

湯洗去

甘遂

炒各一分

杏仁

十粒炒

羅末蜜丸如菜豆空心溫水下

靈苑犀角丸治痰實結滯時發寒熱胃中涎壅及哮喘

哮喘急煩躁不眠

犀角錢一

白朮

桔梗

陳皮錢各一

金銀箔

各三片水銀一錢結砂

巴豆

三粒棗裏燒香

研煉蜜丸如小豆服一二丸薄苛水研量增

張渙消宿食痰滯香橘皮湯

陳橘

焙去白

木香

各一兩

草豆蔻

麩裏煨

白朮

炮

牽牛子

薑黃

各半兩

羅末滴水丸如黍葱白湯下十粒大小便澀乳前

服

保生治膈實氣痞痰盛喘促道遷丸

半夏

洗七次
焙二兩

枳實

炒

檳榔

赤茯苓

各一兩

細末薑汁麵糊丸萊豆大服二三十丸荊芥湯送

下兒小丸

丁時發黑散子治涎壅欬吐逆

天南星

半夏

猪牙皂角

巴豆

白礬

等分

瓦罐煨存性薑汁調半錢或麥門冬桑皮蜜湯下

鄭愈壞涎丸治咽喉涎鳴如鋸兼傷寒身熱面赤

半夏

二錢薑汁作餅慢火炙

粉霜

鉛白霜

巴豆霜

雄黃

蝎梢

各半錢

末麵糊丸如黍服五丸燈心湯化涎未下再投燈心湯即吐如取涎連三服即瀉次補

寒熱往來第二

東氏風邪外客皮膚痰飲內漬藏府致血氣不和陰陽更相乘剋陽勝則熱陰勝則寒陰陽之氣為邪所乘邪與正相干陰陽交爭時發時止故寒熱往來

張漢寒熱往來甚者漸羸痰實壯熱不除變驚癇夏傷于暑至秋成瘡

寶鑑歌

邪入皮膚裏還歸歲府巡陰陽多爭鬪寒熱往來頻

千金治乍寒乍熱

細切柳枝煮汁浴若渴絞冬瓜汁服

水鑑石室秘方兒百日内忽寒熱與冷藥即乳寒嘔逆與熱藥病加甚

桃花蔭末一錢餘甘草充湯力更殊藍花只消

一兩字

乾陰

灌之入口立消除

湯調

聖惠柴胡散治寒熱往來面色痿黃

柴胡

十兩

石膏

一兩

川大黃

微炒

麻黃

去根節

秦朮

常山

各一分

粗散一錢水一盞煎五分溫日三服

醫局小柴胡湯治傷寒溫熱病身熱惡風頸項強急
胃滿脅痛嘔噦煩渴寒熱往來身面皆黃小便不利
大便秘鞭或過經未解或潮熱不除差後勞復發熱

頭痛婦人傷風頭痛煩熱經血適斷寒熱如瘧發作
有時及產後傷風頭痛煩熱

柴胡

半斤

黃芩

人參

甘草

炙各三兩

半夏

湯洗七次焙二兩半

粗末三大錢水盞半薑五片棗一個擘煎七分稍
熱不時分二服

張渙秦艽湯

秦艽

鱉甲

醋炙黃各一兩

川大黃

炒

麻黃

去根節各

半兩

竹茹

甘草

炙各一分

粗散一錢水一盞葱白二寸煎五分溫服

人參柴胡散

人參

前胡

柴胡

各一兩

桔梗

地骨皮

甘草

炙

半夏

洗七次焙各半兩

細末一大錢水一盞薑二片煎半盞溫服

芍藥湯

赤芍藥

一兩

黃芩

當歸

焙

柴胡

各半兩

肉桂

甘草

炙各一分

細末一錢水八分一盞薑二片棗一枚煎五分去

澤溫服

寒熱五藏煩滿第三

巢氏風客皮膚痰漬藏府致血氣不和陰陽交爭故
寒熱往來熱乘五藏氣積不泄而煩滿

王訣寒熱虛積歌

頻頻發熱藏中固有積因傷未退除煩赤口瘡
多躁渴痰生不食胃還虛

先調氣次取虛積下涎後補虛

先調氣次解虛熱有熱不去真珠丸取

真珠丸治五藏煩滿及下風涎積滯驚食疳積

南星

半夏

滑石錢二

輕粉錢七

巴豆霜

粒二七

末麵糊丸芥子大服一二十丸葱湯吞

寒熱腹痛第四

巢氏風客皮膚痰漬藏府血氣不和則陰陽交爭故寒熱往來而藏虛本挾宿寒邪入于藏與寒相搏而擊藏氣故腹痛

聖惠赤芍藥散

赤芍藥

當歸炒

寒水石

甘草炙

黃芩

各半兩

桂心一兩

粗散一錢水小盞生地黃半分煎五分不時溫服

馬通栗丸治脅下氣塊腹痛喘逆氣息往來寒熱羸

瘦不食

馬通內栗

細辛

杏仁麩炒

紫苑各三分

石膏

五味子

秦朮

白茯苓

半夏

各一分

羅末煉蜜丸如麻子粥飲下五丸日三

寒熱結實第五

巢氏風邪客皮膚痰飲漬府藏使血氣不和陰陽交爭則發寒熱而藏氣本實復為寒熱所乘則積氣在內使胃脅心腹煩熱而滿大便苦難小便赤澀千金兒連連壯熱實滯不去寒熱往來微驚悸

大黃

兩一

酸酈根

甘草

炙

黃芩

各十銖

滑石

兩二

桂心

牡蠣

人參

龍骨

凝水石

白石脂

消石

各半兩

以咀水四升煮升半服三合一日夜令盡雖吐亦

與一紫石英半兩

聖惠柴胡丸治寒熱結實或熱攻衝心腑氣急晝夜有汗日漸消瘦不吃乳食

柴胡

川大黃

鼈甲

醋炙淨各半兩

赤茯苓

人參

木香

桂心

枳殼炒

甘草

炙各一分

羅末煉蜜丸如麻子溫水下五丸日三

大黃丸治增寒壯熱發歇不定腹中結實不能乳食

川大黃

炒

柴胡

檳榔

各半兩

赤茯苓

人參

木香

桂心

枳殼麩炒

桃仁

麩炒各一分

羅末煉蜜丸如麻子溫水下五九日三

鼈甲散

鼈甲

赤茯苓

枳殼

麩炒各半兩

川大黃

炒

川朴硝

各一兩

粗羅一錢水一盞煎五分不時溫服

寒熱食不消第六

巢氏邪客皮膚痰漬藏府使血氣不和陰陽交爭脾

胃之氣宿挾虛冷表雖寒熱內冷發動故食不消
千金翼治寒熱咳逆膈中有癖吐乳不食

乾地黄

四兩

麥門冬

五味子

蜜

各半斤

大黃

硝石

各一兩

呔咀水三升煮一升去滓內硝蜜煮沸服二合日
三有宿乳升許出兒大五合

聖惠訶梨勒丸治寒熱往來頭疼嘔吐及乳癖

訶梨勒皮

木香

人參

赤茯苓

桂心

川大黃

炒

陳皮

去白焙各半兩

羅末煉蜜丸如麻子薄苛薑湯下五九日三四

寒熱能食不生肌肉第七

東氏胃氣挾熱熱則消穀穀消則引食陰陽交爭為血氣不和則不能充養身體故寒熱往來雖能食而不生肌肉

外臺大黃丸

大黃一兩蒸二斗米下

桂心

乾薑炮各二分

巴豆五十粒熬淨消石三分熬無芒硝代

篩擣巴豆如泥和蜜擣二千杵丸如梧子壞一丸

湯服熱在膈上當吐膈下當利兩食頃不吐下熱
粥飲動之又不動更服九半能藥壯人二九下多
冷粥解有瘡綿挺如指蜜和一丸塗挺頭旦內瘡
中隅出之不差更作溫病不大便宿食不消亦服
飛尸遁尸採服半九日一心腹脹滿痛服一丸瘡
發日宿勿食清晨服一丸壯人二九得吐飢過發
時乃食婦人產後血結中奔走起上下或絕產無
子或月經不調面目青黃服半九兒淋瀝寒熱腫
脹大腹不食食不生肌三四歲如麻子一丸日一

量加心腹諸病良忌野猪肉蘆筍生葱

寒熱不食羸瘦第八

聖惠鼈甲散

鼈甲

三分

淡竹茹

川大黃

炒各一分

常山

杏仁大

粗散一錢水一盞葱白二寸煎五分去滓研麝一

豆大煎一兩沸溫日三服

鼈甲散

鼈甲

一兩

赤茯苓

子苓

赤芍藥

當歸

炒

川大黃

炒

甘草

炙

知母

各半兩

柴胡

訶梨勒皮

陳橘皮

去白焙各三分

檳榔

三枚

粗散一錢水一盞薑少許煎五分不時溫服利為

度

柴胡散治寒熱往來乳食不下四肢無力腹脹滿上焦痰壅漸漸羸瘦

柴胡

鼈甲

製各一兩

人參

前胡

桔梗

訶梨勒皮

地骨皮

赤芍藥

杏仁

炒黃

甘草

炙

陳橘皮

焙各半兩

篩散一錢水小盞煎五分不時溫服

五味子散

五味子

當歸炒

人參

桔梗

前胡

白朮

赤茯苓

黃芩各一分

甘草炙半

麥門冬焙半

粗散一錢水小盞煎五分溫日三四服

人參散

人參

黃耆

柴胡

白茯苓

鼈甲製

木香各半

甘草炙

白朮

桃仁

炒各一分

訶梨勒皮

二分

細散不時粥飲調半錢

黃耆丸治往來寒熱多汗心煩小便赤黃不欲乳食
四肢羸瘦

黃耆

麥門冬

焙

赤茯苓

白朮

子苓

甘草

各一分

柴胡

鼈甲

製各半兩

羅末蜜丸菜豆大粥飲下五九日三四

瘡疾第九

巢氏以暑客皮膚至秋因勞動血氣腠理虛而風邪

藥之動前暑熱正邪相擊陰陽交爭陽盛則熱陰盛則寒陰陽更盛更虛故發寒熱陰陽相離則寒熱俱歇若邪動氣至交爭復發故瘥休作有時發時漸晏者由邪客風府循膂而下衛氣一日夜常大會于風府其明日日下一節故日晏發早者衛氣行風府日下一節二十一日至尾骶二十二日入脊上注伏衛脉其行九日出缺盆內氣既上故發更早間日發者邪氣內薄五藏橫連募原其道遠其氣深其行遲故間日蓄積乃發兒未觸暑亦病瘥者乳母抱持解脫

不避風故

聖惠夏傷暑熱客皮膚至秋復為風邪所折陰陽交
爭故發寒熱而成瘧欲解則有汗汗多則津液減耗
又熱乘干藏則生虛躁差後藏府未得復內猶有熱
故渴而引飲引飲不止小便澀者變飲癖

茅先生兒身發寒久後脾熱則身熱渴因傷寒三四
日熱不退誤下冷藥脾氣不順遂至脾寒疾瘧

惠眼春夏蘊積寒暑不常之氣久不宣泄至秋後陰
陽交冷熱非時故成瘧因宿疾在心脾間須常山飲

侵早喫吐下黃水後用勻氣散和胃氣不如此間服便
不吐

寶鑑歌

瘡病是邪成陰陽有競爭早期風府會晏發脊
俞停至速連朝發來遲間日行小兒還見此何
必問神明

水鑑百日内瘡

瘡是邪風寒熱攻宜須術治免成空常山刻作
人形狀丁釘孩兒生氣宮

孫尚藥治痞

信砒

二兩

寒水石

三兩

用鐵鉋先鋪石末一半後堆砒末復以石末蓋厚
蓋覆之周圍醋糊紙封固約十重炭一斤燒紙條
黑取出置地冷開盞淨刮末細研軟米飯丸如梧
子兒服如黍飛辰砂衣發日早臘茶清下一丸一
日不得食熱物合時洒掃淨室勿令婦人猫犬雞
鼠等見婦人患男着在口中男患亦然

聖惠牡蠣散治痰癰瘡發無時

牡蠣

常山

烏梅肉炒

人參各半兩

鼈甲

三分

知母

川升麻

甘草炙

豉心

桃仁麤炒各一分

細羅溫酒調半錢日二量加減

升麻散治瘡疾發後煩熱

川升麻

常山

蜀漆

川大黃炒

姜蕤

黃芩

桂心各一分

川芒硝半兩

粗散一錢水一盞煎五分溫服吐利為度量與

桃仁散瘡疾發歇寒熱小便黃赤

桃仁

炒

赤茯苓

鱉甲

各三分

知母

黃芩

川升麻

各半兩

甘草

炙一分

粗散一錢水一盞煎五分日三四溫服

治瘡疾痰壅煩悶常山散

常山

甘草

炙

川大黃

各半兩

桂心

一分

粗末一錢水一盞煎五分發前溫服吐利為度量

減服外臺無大黃酒煎

大蒜丸

獨顆蒜

心去

巴豆

各一枚

巴豆內蒜中濕紙裹煨熟擣丸如麻子醋湯下一
丸更量吐利為度端午合

茅先生脾寒鬼笑散

常山

大腹皮

白茯苓

鼈甲炙醋

甘草炙

等分前三味不見火末二錢水一盞冬取桃柳枝
各二七寸煎五分臨發服吐涎不妨

嬰孺前胡湯治時氣兼瘡

前胡

黃芩

升麻

各四分

細辛

甘草

芍藥

各三分

大黃

常山

各二分

水一升六合為四服日二夜一

吉氏草葉散

草葉

半夏

各半兩

柴胡

厚朴

甘草

炙

烏梅

棗

各一兩

常山

一分

末二錢水一盞薑二片煎七分服或去柴胡加薑

甲

朱氏

上等臘茶硫黃飛

細末服一錢米飲調發日五更服寒多倍硫熱多倍茶

襍灸刺法

千金翼肝瘡色花花然太息狀若死刺足厥陰見血
心瘡心煩甚欲得清水寒多不甚熱刺足少陰謂神
門

脾瘡病寒腹痛熱則腸鳴鳴已汗出刺足太陰
肺瘡心寒甚熱間喜驚如有見刺手太陰陽明
腎瘡悽悽腰脊痛宛轉大便難目眴眴然手足寒刺

足太陽少陰

胃瘡旦病寒喜飢不能食肢滿腹大刺足陽明太陰
橫脉出血

岐伯曰瘡有十二種瘡鬼得瘡字便愈

寅時發者獄死鬼所為以瘡人着壺上灰火一周不
令火滅差

卯時發者鞭死鬼所為用五白衣燒灰三指撮着酒
中無酒清水服

辰時發者墮木死鬼所為令瘡人上木高危處以棘

塞木奇間差

巳時發者燒死鬼所為令瘡人坐篩周匝燃火差
午時發者餓死鬼所為令瘡人持脂火于田中無人
處以火燒脂香假拾薪去差

未時發者溺死鬼所為臨發時三渡東流水差

申時發者自刺死鬼所為欲發時以刀刺塚上使得
姓字祝曰若差我與汝掇却差

酉時發者奴婢死鬼所為令瘡人碓梢上捧上卧莫
令人道姓字差

戌時發者自絞鬼所為左索繩繫其手脚腰頭差
亥時發者盜死鬼所為以刀一口箭一隻灰一筒刀
安瘡人腹上其箭橫着底下差

子時發者寡婦死鬼所為令瘡人脫衣東廂床上左
持刀右持杖打令聲不絕瓦盆盛水着路邊差

丑時發者斬死鬼所為令瘡人當戶前卧頭東向血
流頭下差

灸瘡法醫不能救者繩量病人脚圍繞足跟及五指
一匝訖截斷繩取量繩置項上着反向背上當繩頭

處中脊骨上灸三十壯候復惡寒再灸三十壯至過
發一炊久雖飢勿食盡日此法神驗男左女右

外臺灸譙譙在肩膊內廉俠第六椎下兩傍各三寸
手按之痛病者言噫嘻足太陽脉氣所發灸五壯主
液泡攣暴脉急引脅痛內心肺從項引至脊以下至
十二椎應手灸之立已熱病汗不出肩背寒熱瘧丘
引身熱欬嗽上氣虛喘喘逆軌衄肩甲內廉痛不可
俛仰眇季脇引少腹而脹痛兒食晦頭痛引頤瘡瘡
風

寶鑑灸大指次指外

瘡先熱後寒第十

葉氏云溫瘡得之冬中風寒寒藏骨髓至春陽氣大發邪不能出遇大暑腦髓燥脉肉消釋腠理發泄因用力邪與汗皆出此病藏于腎氣從內出陰虛而陽盛則病衰氣復反入入則陽虛陽虛則寒故先熱後寒名溫瘡先寒後熱由夏傷暑汗大出腠理開發遇夏氣濟滄之水寒寒藏腠理皮膚中秋氣傷于風則病盛亦以時作名溫瘡夫寒陰氣也風陽氣也先傷

寒後傷風故先寒後熱先傷風後傷寒故先熱後寒
亦名溫瘧夫瘧六七日但熱不寒者溫瘧也

千金常山湯

常山

兩一

小麥

合三

淡竹葉

一升

升外

水升半煮五合一日至七日兒一合為三服量加

鹿角末先發時服一錢

燒鼈甲灰酒服一錢七發時服并以火灸身

灸乳下一指三壯

瘧寒而後熱第十一

巢氏痲痺者夏傷于暑也秋則寒甚冬則寒輕春則惡風夏則多汗蓄作有時以痲之如發先起于毫毛伸欠乃作寒慄鼓顙腰脊痛寒去則內外皆熱頭痛而渴欲飲此陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移也陽并于陰則陰實陽虛陽明虛寒慄鼓顙巨陽虛腰背頭項痛三陽俱虛陰氣勝則骨寒而痛寒生于內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱內外皆熱則喘而渴欲飲此得之夏傷于暑熱氣盛藏于皮膚之內腸胃之外此榮氣所舍令汗出空踈腠理開因得

秋氣汗出遇風而發及浴水氣舍皮膚內衛氣并居
衛氣者晝日行陽此氣得陽如出得陰如內薄是以
日作間日作者謂氣之舍寫內薄于陰陽氣獨發陰
邪內着陰與陽爭不得出故

千金常山丸治痰瘧

常山

知母

甘草

炙

大黃

各三分

麻黃

去根節
一兩

末蜜丸如桐子兒如黍三丸熟水下漸加差為度

活人書治瘧先寒後熱兼治支結

公名集言
柴胡

八兩

人參

炙

半夏

浸七次

黃芩

桂

去皮各三兩

劉如麻豆抄五錢水一盞薑七片棗二個煎八分
溫服日三夜一渴去半夏加人參苦薑根

瘧疾寒熱更作第十二

巢氏寒并于陰則寒風并于陽則熱陰陽二氣更實
更虛故寒熱更往來為熱瘧

指迷論寒熱不時腸滿膨脹起則頭暈大便不通或
腹痛胃膈痞滿由宿穀不化結于腸間氣道不舒陰

陽交亂宜備急丸又云久不治成勞

荊芥散

荊芥

人參

白朮

當歸

黃耆

芍藥

桂

去皮各一兩

柴胡

二兩

甘草

炙半兩

粗末五錢水二盞煎一盞溫服

備急丸

大黃

濕紙裹煨

巴豆霜

乾薑

去皮

等分細末蜜丸如豌豆米飲下一丸羸人一九如

萊豆利為度

瘡熱而不寒第十三

巢氏肺素有熱氣盛于身厥逆上下中氣實而不外泄因用力腠理開氣寒舍皮膚之內分肉之間而發陽氣盛而不衰則病氣不及陰故但熱寒氣內藏于心而外舍于分肉間令人消燂脫肉名瘴瘡陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩惋手足熱而嘔聖惠香豉飲治瘴瘡嘔逆不食

香豉

半合

葱

七莖

常山

檳榔

各三分

升麻

兩一

生地黃

鼈甲

兩一

知母

各兩半

劉水二盞半煎盡半不時分三服一日盡兒一合

又方

常山

桃仁

炒熟

黃丹

炒紫各一兩

香豉

炒一合

羅末蜜丸如桐子發日空心煎桃仁湯下十九發時再服兒粟大五丸

治痰熱發瘡知母散

知母

鼈甲

醋炙各一兩

牡蠣

常山

各半兩

細羅粥飲調半錢日二

牛黃丸

牛黃

杏仁

等分研如膏煉蜜丸麻子大溫水下三九日三量與

張漢知母丹

知母炒

鼈甲炙酥

川大黃炒

赤茯苓

朱砂飛各一兩

川芒硝

川升麻各半兩

龍腦錢一

末蜜丸如黍服五七粒薑湯下大便利愈

活人書

知母

六兩

甘草

炙二兩

石膏

一斤

桂

去皮三兩

粳米

二合

劉麻豆大五錢水盪半煎八分服

瘡寒而不熱第十四

巢氏寒瘡由陰陽相并陽虛則陰勝而寒寒發于內而并于外內外俱寒故病發但戰慄鼓頤頤也

指迷論瘡寒從背起冷大如手不甚戰慄似欲熱而汗出或即頭痛嘔吐時作脉遲小由脾胃素弱因氣寒而收聚水穀不能剋化變而成痰伏痰在內陽為

陰藥故陽作寒逼而成汗宜旋覆花丸半硫丸
聖惠雄黃丸

雄黃

硫黃

朱砂

桂心

乾薑生

巴豆

煮去油
各一分

麝半兩

阿魏半分

研細醋煮麵糊丸如桐子未發前綿裹一丸安耳
中男左女右帛繫一粒于臂可治七人

聖惠方

獨顆蒜

一個

黃丹

半兩

端午午時擣千杵丸如黑豆發時溫茶下二丸兒

粟大

常山丸治瘡手足鼓顫心寒面青

常山

兩半

臭黃

雌黃

猢猻頭骨

天靈蓋

虎頭骨

安息香

朱砂

野狸頭骨

砒霜

乳香

阿魏

白芥子

各一分

萊豆

生搗羅軟飲和搗三二百杵丸如桐子忌孝子女
人見端午午時合緩急不擇日未發前絳囊盛中
指繫一九男左女右三日不住湯服一九孕婦兒

不得服忌熱物一方止
席御息香天蓋砂砒魏等
分

張渙烏梅丹

烏梅肉兩一 母丁香 乾漆炒 當歸

桂心兩各半 麝分一

蜜丸如黍粥飲下十粒

括迷旋覆花丸

旋覆花 桂心 枳實炒 人參各五分

乾薑 芍藥 白木各六分 茯苓

狼毒

烏頭

炮去皮

礞石

煨一分伏時

細辛

大黃

煨

黃芩

葶藶

厚朴

炙薑

吳茱萸

炒

羌活

炒

橘皮

各四分

甘遂

炒三分

細末蜜丸如桐子米飲下三丸至七丸兒黃米大

二丸

半硫丸

半夏

湯洗七次三兩

硫黃

飛二兩

末薑汁糊丸如梧子米飲下三十丸兒黍大三五

九

瘧熱多于寒第十五

指迷論曰寒熱戰慄頭痛如破身體拘急數欠飢冷
或先寒後熱或先熱後寒或晡時發或間日作至其
時便發發已如常其脉弦弦數多熱弦遲多寒因冬
中風寒藏于骨髓至春陽氣大發邪不能出遇大暑
與邪合合而發熱多宜解常山湯苦薑湯
常山湯

常山

知母

甘草

炙各
三兩

麻黃

淨一
兩

粗散五錢水二盞煎一盞溫服糜粥一盃助汗

蘇蘇湯

蘇蘇根四兩

柴胡八兩

人參

黃芩

甘草各炙三兩

粗末五錢水二盞薑三片棗一個煎一盞溫服

瘧寒多于熱第十六

指迷論證周前而寒多者宜薑桂湯溫之

薑桂湯

乾薑

牡蠣煨赤

甘草炙各二兩

桂心三兩

柴胡

八兩

蘇蘇根

四兩

黃芩

二兩

粗末五錢水二盞煎一盞不時溫服

活人書祛邪丸治瘡脉浮大寒熱往來用此吐衛州書云瘡寒多熱少者痰多也脉必浮可吐之若遲微者惡寒瘡耳宜柴胡薑桂

麻黃

四兩淨泡一二沸

常山

甘草

炙

大黃

知母

各三兩

末蜜丸如梧子服十五丸面東淨水吞

瘡寒熱相等第十七

指迷論脉證見前瘡發寒熱等者宜調之

鱉甲湯

鱉甲

醋炙

白朮

常山

桂心

柴胡

各一兩

牡蠣

煅半兩

粗散五錢水二盞煎一盞溫服

瘡瘡第十八

巢氏山瘡瘡生于嶺南帶山瘡之氣寒熱休作有時
由挾溪源嶺濕毒氣故也重于傷暑之瘡

千金大五補湯治時行後變瘡瘡

桂心銖卅

遠志

桔梗

芎藭各二兩

茯苓

芍藥

人參

白朮

乾地黄

當歸

黃耆

甘草各三兩

竹葉五兩

半夏

麥門冬各一升

生枸杞根

薑各一斤

大棗廿枚

以咀水三斗煮竹葉枸杞取二斗內諸藥煎六升分六服日夜令盡兒量與

鯪鯉湯治乍寒乍熱乍有乍無山瘴瘧

鯪鯉甲十四枚

鼈甲

烏賊骨各一兩

常山三枚

附子

炮一枚

呔咀酒三升漬一夕發前稍啜勿絕即吐蕪塗身
斷食過時兒量與

久瘥第十九

巢氏瘥傷暑傷風所致熱甚時發汗吐下過度脉藏
空虛榮衛傷損邪氣伏藏引日不差瘥發至三歲連
日發不解脅下有痞勿攻但得虛其津液先時發汗
服湯先小寒寒者引衣自覆汗出小便利愈

水鑑方

水蛭

狗蟲

各一枚

雄黃

阿魏

各少許

研細馬汗為膏塗手心立差

狗蟲既同水蛭用忍蠶虫

外臺常山散

常山

羚羊角

炙焦

烏梅肉

炙各三兩

黃芩

二兩

甘草

炙兩半

搗散竹葉煮飲取六七合調三方寸匕發前服不

差臨發又進老人小兒意量忌海藻松菜葱

聖惠砒霜丸

砒霜

醋熬三次

朱砂

各一分

相思子

巴豆霜

七枚

母丁香

阿魏

半錢煨

常山

一錢

羅末蜜丸如黍米發冷水下一歲一丸

蜀漆丸治久瘧不斷胃脅痞堅

蜀漆

杏仁

炒

黃連

桂心

甜葶藶

隔紙炒紫各一分

川芒硝

川大黃

炒

半兩

羅末蜜丸如麻子粥飲下五丸日三

神效方

大蜘蛛

五枚去脚

蝙蝠

鼈甲

醋炙各一枚

麝香

半兩

蛇蛻一條

羅末端午午時蜜和丸如麻子空心溫酒下五丸
兒茶下二丸

嬰孺牡蠣散治癰瘡發無時服三稜飲後宜此

牡蠣

知母

常山

烏梅肉炒

人參

各三兩

鼈甲

炙四分

升麻

甘草

炙

鹽豉

各三分

桃仁

七個

末空心酒下二錢日再

三稜飲

三稜根

鼈甲

大黃各三分

水八合煮二合半為三服乳母忌菹菜油膩

聖惠灸內庭一壯炷如麥足大指次指外間陷者中

瘡後引飲第二十

巢氏夏傷暑熱客皮膚至秋復為風邪所折陰陽交爭故發寒成熱瘡凡瘡欲解則汗汗則津液減耗又熱乘藏藏虛燥差後藏府未和津液未復內猶熱渴而引飲不止小便澀者變癰

聖惠烏梅散治瘡發作不定多渴心煩

烏梅肉

炒半兩

常山

一兩

甘草

炙三分

粗散一錢水一盞淡竹葉七片小麥卅粒煎五分溫服

瘡後脅內結硬第二十一

巢氏瘡正發寒熱交爭時熱氣乘巖巖則燥渴引飲飲停成癖結脇下故差後結硬

肘後治心腹堅痞時時寒熱如瘡服紫九六十日吐下痞仍堅雞子湯去惡物數升遂愈

甘遂

銖七

甘草

炙

黃芩

各三錢

水二升半雞子一枚少扣開出白投水中熱攪吹
去滓內藥煮一升隨兒可下數合病未盡更與若
堅實多者加黃芩細辛各一两

嬰孺知母丸除熱下氣

知母

甘草

常山

各一两

麻黃

去節二兩

末蜜丸如小豆服五九日三至欲發服畢沫發日
亦可服加大黃一两治骨間熱卧不安

瘡後頭面浮腫第二十二

聖惠防葵散治瘡發後肚脹兼頭面浮腫

防葵

柴胡

桑白皮

川黃

炒各半兩

甘草

炙赤一分

粗散一錢水一盞煎五分溫服日三量加減嬰孺忌菰菜油膩生冷黏滑物乳母同

幼幼新書卷第十八

斑疹麻豆 凡十六門

後學古吳陳履端于始輯

黃山夏九疇元錫校

痘疹論第一

聖惠論疹痘瘡是熱積藏府蒸鬱熱毒散四肢兒皮肉嫩弱多此疾乳孩少與湯藥童兒過劑有損蓋飲熱乳而成府熱生細疹藏熱生豆瘡湯藥宜療乳母絕乳者由積熱伏脾肺間不早以湯藥療熱行于四肢榮衛之中漸透皮表成疹痘出濃水也嬰兒性陽

盛陰微藏府陰陽氣逆大小便多秘不通即便踈利輕患也若疹痘已出勿踈轉出宜利大小腸扁鵲倉公云先和節陰陽調治榮衛方利藏府即熱氣漸解絕乳嬰孩疹痘未出前以油劑服之行解四肢熱極已出不可以油宜平和藥療肝藏解敗熱慮熱毒攻肝衝眼目生障腎時醫于疹豆未出前誤認疾候或餌燥藥涼藥不無夭傷惜哉

養生曰陽明主肌肉瘡疹毒泄肌肉始覺必以利藥宣其毒初與傷寒類不可不審兒身熱耳冷尻冷歔

嗽瘡疹候一歲中瘡疹大小相類此疫氣也當作疫治傷寒至陽明經亦用利藥須未見瘡疹疑似間乃可及見勿利

錢乙論面燥頤赤目胞赤呵欠煩悶乍涼乍熱欬嗽嚏噴手足稍冷夜卧驚悸多睡並瘡疹證此天行病用溫涼藥勿妄下及妄攻發受風冷五歲各有證肝水疱肺膿疱心癰脾疹歸腎變黑惟癰疹後或發癰木勝脾木歸心故也

兒在胎十月食五藏血穢生則毒當出故瘡疹皆五

藏液故瘡出有五肝主淚淚出如水肝為水疱色青
小肺主涕涕稠濁肺為膿疱色白而大心主血為斑
色赤而小次于水疱脾為裹血為疹小次癰瘡色赤
黃淺涕淚出多故膿水疱皆大血營于內出不多故
斑疹皆小疱者涕淚俱少脾胞中容水水去則瘦始
發潮熱三日以上熱運皮膚即發瘡疹不甚多者熱
留膚腠間也潮熱隨藏出如早食潮熱不已為水疱
之類瘡疹始出五藏證見唯腎見平證耳及骹涼是
也骹耳俱屬腎居北方故瘡黑耳骹反熱為逆百祥

九牛李膏各三服不愈者死凡瘡疹一發出盡者重
夾疹者半輕半重出稀者輕裏外肥紅者輕外黑裏
赤者微重外白裏黑者大重瘡端裏黑點如針孔者
勢劇青乾紫陷昏睡汗不止躁熱渴腹脹啼喘大小
便不通者困乳母慎口勿令饑及受風冷大熱當利
小便小熱宜解毒黑紫乾陷百祥丸下門不黑慎
下更看時月輕重大抵春夏順秋冬逆冬月腎王又
盛寒多歸腎變黑又辨春膿疱夏黑陷秋斑冬疹不
順猶十活四五黑者無問何時十難救一其候或寒

戰噤牙、或身黃腫、熱急、以百祥丸下、復惡寒不已、身
冷出汗、耳聾反熱、死、腎氣大王、脾虛不能治、故下後
身熱氣溫、欲飲水、脾生勝腎、寒去而溫熱可治、更宜
解毒、妄下則內虛多歸腎、若能食、痂頭焦、或未焦而
喘、實可下、身熱煩渴、腹滿而喘、大小便澀、面赤悶亂、
大吐、當利小便、不差、宣風散下門、慢驚若五七日、痂不
焦、是內熱蒸皮中、宣風散導之、生犀磨汁解之、瘡疹
由內相勝也、惟斑疹作搐、疹為脾所生、脾虛而肝乘
之、木來勝土、熱氣相擊、動于心神、心喜為熱、神不安

因搐成癇斑為心所生心生熱熱生風風屬肝二歲相搏風火相乘故搐當瀉心肝補母苦薑湯主之

慢驚

門、瘡黑雖腎用事然脾氣本強或驚服補脾藥脾實能制之瘡入腹忽瀉膿及連痂皮得出是脾強腎退病出而安米穀及瀉乳不化是脾虛不能制腎難治論瘡疹標本云瘡疹未出若言胃熱何以乍涼乍熱若言母腹中癰在脾胃何以驚悸不知兒在母腹月至六七已成形食母穢液入五歲至十月滿胃管中口有不潔產時拭淨則無疾黃連汁壓之下臍糞及

穢涎也。本因微寒入而成瘡疹未出。五藏見證。一藏受穢多者。乃出瘡疹。初欲病時。先呵欠煩悶。肝也。時發驚悸。心也。乍涼乍熱。手足冷。脾也。面目頰頰赤。嗽嚏。肺也。惟腎在腑下。不食穢。故無候。凡瘡疹五藏毒若出歸一證。則肝水疱。肺膿疱。心斑。脾疹。瘡黑。屬腎。由不慎風冷。而不飽。內虛也。抱龍丸數服愈。風熱門論熱傳痘疹云。四大王宮。五太尉。因墜韁鞅。發急驚。後大熱先退熱。以大黃丸。玉露散。惺惺丸。加牛黃龍麝解之。不愈。至三日。肌尚熱。錢氏必發斑瘡。蓋熱不

能出他醫初發散入表表熱則斑生初驚時當利驚
發散逆也後二日果斑出必勝膏門治七日愈

論瘡疹有誤睦親宅一大王病瘡疹錢留抱龍丸三
服李下之疹稠密錢驚為逆曰瘡疹始出未有他證
勿下當用平和藥頻與乳食不受風冷三日不出或
出不快微發之不出即加藥又不出即大發大發不
多脉平無證瘡本稀也有大熱利小便小熱當解毒
若出快勿發勿下止用抱龍丸瘡痂若起能食者下
之宜大黃丸未一二行即止今先下一日瘡疹未能

出盡而稠密甚誤也縱安病有三一疥二癰三日赤

經三日黑陷錢曰幸不發寒未困也用百祥丸藥牛

李膏為助門倒壓各一大服至五日間瘡復紅活七日

愈蓋黑歸腎也腎主勝脾土不剋水故脾虛寒戰難

治用百祥丸以瀉膀胱之腑腑不實藏自不盛也不

瀉腎者腎王虛不受瀉也若二服不效即加寒死

瘡疹欲發未能辯認間服升麻葛根湯單傷寒門消毒散

疹攻咽痛門已發未發皆宜仍用胡荽酒疹初出門黃蘗膏發

面目暑月煩躁食後與白虎湯實熱門王露散驚熱門熱

盛與紫雪

攻咽門

咽痛或生瘡與甘桔湯

實熱門

甘露飲

明

張渙論兒瘡疹與大人傷寒相似雖療不同或愈或危在六七日間可不慎哉十歲外方可施湯藥然邪熱多在脾肺間若不求本早治養熱氣行四肢利害甚多童男長大肌體稍實毒氣難出覺似瘡疹便早疎利即熱輕易療瘡疹未出前或熱乘心心神易動即發驚癇不投湯藥即危若已出長快自不可利正如傷寒下早又兒十四歲內初覺頭痛壯熱腰背疼

重熱甚則手足厥冷却似挾寒脉多洪數甚大不定若小便多赤大便多秘宜先疎利應瘡疹早出若繞出皆不可轉利

疹痘論疹痘瘡者因熱積藏府蒸鬱毒氣而生府伏熱生細疹赤瘡俗呼麻子藏伏熱生豆瘡形如豌豆其始熱積脾肺間治不早流注四肢榮衛中而成初受病似傷寒身與四肢俱赤壯熱頭痛腰脊疼只鼻耳尖足指冷兼欬嗽眼青黃色大小便秘兩手脉洪數是豆疹證冬月天氣溫暖仍感乖氣未發至春被

積寒所折毒不得泄夏初得熱春寒始解冬溫毒氣
方發有不因冬溫四時自天行者又有兒熱毒之氣
傷天令不時之氣而發者有感寒邪伏熱毒真元之
氣被熱毒邪氣渾雜而發者巢氏呼發瘡胞瘡麤瘡
皆分陰陽所受凡覺冬有非節之暖當瘡未發急下
其毒春冬間天枉者十五六醫死者太半蓋證候形
色不同致有差誤有三五日遍身粟生時欬嗽耳尖
冷毛寒肌慄眼澀不開作寒欲以溫暖覆者初覺時
薄苛散微汗或不汗兼作調中散

已出未出門

漸漸解若

寒熱脉反遲進脫齒散

出不快門

或寒熱不定目澀耳聾

冷此邪毒不傳諸藏反攻皮膚而作或出遲者亦服

脫齒散凡三五日鼻壅咽喉不利欬嗽目赤毛焦肌

膚緊脉洪大而數此豆疹底順者薄苛散發汗瘡自

出或鼻壅咽喉不利目赤額紅脉不甚洪大亦瘡疹

候皆宜脫齒散瘡如白珠子或紅小乃解也或鼻壅

唇焦脉細面痿黃時變青皮膚悞吐清涎者亦疹子

候皆誤下涼藥多致瘡難發凡瘡毒血氣順脾溫則

易發涼藥過多則血澀氣弱脾寒瘡毒難泄遂變惡

候亦服薄苛散脫齒散若面青氣粗大小便不通瘡

毒未發宜清石散

快出如

大小便不通利服脫齒散

次觀色候調治或面赤亦瘡疹候若先赤後青為逆

或患數日面青或痿黃四肢微冷上喘不涎手足搐

縮以三焦氣壅血脉凝滯氣不得榮薄苛散發泄瘡

毒兒初病便驚狂身熱汗出不增寒不惡風脉洪數

者皆當下覺有此證服當歸散

瘡未見可

或先頭疼

口鼻熱氣增寒壯熱脅膈痞壅生涎心逆作渴不止

足指冷口臭兩手脉弦或微脾脉弦數因失飢傷邪

熱當發赤疹及患頭疼身不大熱口鼻熱氣咽喉乾
痛口頰生瘡兩目如火耳尖手足稍冷兩手脉洪大
後三二日必作渴面赤時增寒心逆口臭目忽如朱
亦伏瘡疹候先去邪毒須大黃湯蕩之或已結皮毛
間誤利之毒反沒伏心間邪入肺瘡毒內壞而死若
瘡疹既出太盛竇濃水者大黃藥微利除毒如未發
毒疹前曾經利者勿用但解熱除毒愚俗不以藥泄
利致大小便不通停熱蔽府攻衝眼鼻咽喉腫塞口
舌壞爛只進涼藥或調氣藥恣其所措出後又猛利

用藥雖扁鵲難療又扁鵲覺有痘譴先用麻油劑

初出

門解四肢熱毒良久就卧至三五服大小便利四肢

熱退邪毒漸解至出亦輕曾服大黃散不必服未解

利而毒已發服解毒必聖散或升麻散發散

已出未出門

在肌膚三四日隱隱不發急用紫草飲

初出門

數服凡

未發前用黃蘗膏

愛護面門

塗兒面頰眼目間仍用胡

荑酒

初出門

噴背上四肢令速出若未出雖出躁渴者

宜甘草散

太盛門

解利熱毒即住若出遲服紫草飲大

人針兩腕硯子骨間或灸一壯亦助發痘若已發勿

用如未作膿心膈躁睡不安者服青黛散黑豆汁出未

可疎利門毒盡宜黃芩散解餘毒嘔吐服之自止若赤口

下部俱有瘡自利者服黃連散或出後煩喘小便不

利宜燈心湯疹後解餘毒門若煩喘甚者麻黃湯太盛門或咽

嗑痛并嗽入麝服冷藥太過欬嗽手足冷脉遲者煎

炮乾薑炙甘草各四錢水升二合取四合服或下痢

赤黃膿血及渾身熱與薤白湯便血門解去惡積差有

疹痘安後眼生翳腫脹者皆肝藏敗熱停留所致切

忌點藥唯利脾肺解肝熱仍於眼邊上下貼協藥散

毒服蕤仁散腎重兼蜜蒙花散量力服食

並入眼門

凡天

行瘡豆預服豆湯不發瘡

汁黑豆

或發瘡因天行熱氣

庖瘡身疼壯熱當以桂枝及去節麻黃黃芩各半兩

為末量大小一二錢煖水調覆汗又葛根散解肌

已出

未出凡身疼壯熱頭痛不小汗無由表散大便久秘

毒氣藏伏心腹脹滿不微利無由釋去切在消息若

已出發表增瘡爛發膿痛甚者用乾淨黃土末傅仍

數食蜜若勢稍輕猪膽汁調川芒硝塗分令動候痂

落有大段瘡發不通卧席者麥麩簞卧得息如作漿

戴白膿者毒輕紫黑隱隱肌肉內者重甚者五藏咽
喉內皆有瘡其不便便澀出血瘡黑靨不出膿者死
舌皁黑者死或疹豆未出前熱毒內逼目撥上竄驚
叫此瘡欲出候誤認驚風治毒內畜邪熱不泄死或
惡瘡既出譫語不止是惡候更以冷藥解利使聲瘖
瘡疹反沒死或用燥藥太過咽喉腫痛猛發皁血喘
嗽死或瘡作白疱忽然畜入藏府漸作紫黑無膿日
夜煩悶者服化毒散倒靨門毒從手足心出差此五死
一生候若便血瘡壞無膿者十死大熱瘡毒頓出者

然後依證調理有患瘟疫豆瘡不出者一法以地黃
雄黃令飲勿太多恐反有損或飲啜熱乳積藏府者
兼療乳母嬰兒孩童之性陽盛陰微藏府陰陽氣稍
差逆大小便多不順利自扁鵲倉公論療嬰孩藥性
有可餌者皆先知節氣陰陽調利藏府則病勢漸解
也

張仲景兒生進地黃汁下黑糞不患瘡疹百日内遇
天氣和暖無惡風時抱日中使皮膚緊密常柰風日
只在房室溫煖處忽見風日使寒邪伏積藏府遇天

氣不調多作瘡疹。瘡疹方得寒邪散毒氣消也。兒患瘡。父母行房觸犯。使不出毒入心。悶亂而死。已出令黑爛痛如刀割。縱得安。癰經年色黑。瘡未生。燒赤木猪甲二物辟惡氣。勿令外人入房。恐令瘡難出。或得上喘面青黃色。尤良。犯此死者不可勝數。又瘡痂雖落。癰猶壓肌肉。或凹凸。載作瘡疹。此安後不解。利毒氣留滯。敗熱肌肉間也。

活人書論瘡疹。傷寒疑似間。只與升麻湯。傷寒發斑門綠升麻湯解肌。兼治瘡已發未發。皆可服。傷寒身熱固。

不可下瘡疹發熱在表尤不可轉至已出或膿血太

盛用疎利皆非大拒首尾慎下若身熱耳冷尻冷欬

嗽輒利之毒入裏殺人但與化毒湯紫草木通湯並

出未鼠粘子湯攻咽太盛犀角地黄湯解之太盛若

出不快煩躁不眠水解散時氣麻黃黃芩湯升麻黃

芩湯並傷活血散主之快門黑瘡倒靨猪尾無以散

龍腦膏無不驗也倒靨若熱毒攻咽如聖湯攻咽瘡

豆入眼決明散撥雲散蜜蒙花散通聖散蛤粉散主

之瘡出

眼門

指迷論瘡疹初出往往以胡荽酒葡萄酒及諸溫熱藥發之使快或隱皮膚間以火煨人齒調服又云始得勿投涼藥恐胃冷致瘡不發多以為瘡疹宜溫余見執此論者致病人耳目口鼻悉平咽中閉塞大便堅秘小便皆血而死又見疱瘡頭黑凹為倒靨由始失調解更增煖溫湯藥孤陽無陰鬱毒不散熱無從出反攻府藏其氣俱絕又加溫藥發之斃者不可勝數余究此疾亦時氣之一端有如癰疹麤片者有赤熱如斑者有豌豆狀者或大小不等皆出膿水者亦

謂膿疱蓋毒有淺深故發有異狀其先風邪外客皮膚熱不得泄則為癰疹但皮膚瘙癢其疾輕熱蘊于內外風搏血則為赤斑毒氣深蘊伏藏府閉經絡內外相合熱畜血聚壅遏不行結而成膿則為疔瘡始發令頭痛發熱皮毛洒淅如寒手足耳鼻時冷胷中煩躁如針刺皮中時痒甚者昏睡譫語脉大小不定應指必疾甚者六七至脉必日數深而後見慎無惶惑亂治始覺頭痛發熱微寒煩躁咽痛者宜四味升麻湯已出未出門瘙癢成癰疹者荊芥湯時嘔者小柴胡

湯不惡寒但煩躁小便赤澀多渴成赤斑點者竹葉

湯犀角飲子

並已出未出門

大便不通宜四順飲子

溫壯門昏

甚譫語大便不通與大承氣湯

大小便不通門

若自利黑黃

色此毒出廣與湯劑恐增他病大便已利勿以溫藥

助之瘡稀少而自快利只升麻湯荊芥湯

董汲斑疹總論兒斑疹一候不惟脉理難辯治療比

他病尤重始覺證與傷寒陰癰相近醫視病不精投

藥暴妄况兒藏府嬌嫩易為傷動斑疹未出疑為傷

風即以麻黃等發汗使表虛裏實若陰癰治用溫驚

藥熱勢愈盛直至證候定方治斑瘡所失多矣大率俗醫斑疹欲出熱藥發之使胃熱極已出者變黑而陷又謂不快熱藥熏蒸得熱則出愈難轉生熱證大小便不通更以巴豆取積藥下之使藏府內虛熱又不除邪氣益深變為喘滿便血或為痘瘡體裂痛哉然斑疹本胎中積熱及將養溫厚偶胃熱乘時而作外臺云胃爛發斑微者赤五死一生極者黑十死一生府熱為疹淺也藏熱為痘深也故證色論云大者屬陰小者屬陽以當壬申歲冬無大雪天氣甚溫速

春兒病斑疹醫類投白虎湯不知白虎湯本治大人
孫真人論大小為治不殊藥劑多少為異是未知其
用藥法多失誤也

瘡疹候第二

巢氏傷寒熱毒氣盛多發庖瘡色白或赤發于皮膚
頭作癰漿戴白膿者毒輕紫黑色根隱肌肉裏毒重
甚者五內七竅俱有如發豆故名

茅先生麻豆各有說豆候早晨渾身微熱午後大熱
眼白黃兩脇下吸吸動更發甚如驚風遍身大熱手

足逆冷病屬藏治用獨勝散

已出未出門

發豆慎不得瀉

麻候渾身熱午後大熱眼不白不黃微赤手足冷吐逆此屬府治亦依豆候

真珠囊豆瘡外應候

壯熱汗不流先躁而出者主心

先嗽而出如砂子形者主肺

先肚痛而出疹子者主脾

先如瘡發渴後為水疱或有黯血者主腎

先目赤如珠暗流羞明出瘡子或有硬膿而不破者

主肝

茅先生麻豆惡疾歌

斑疹出後熱難除冷藥先冰在腹居渴甚瀉多
便溺澀不餐躁發命須臾

玉訣斑疹候歌

傷寒胃熱作斑瘡倒靨因風氣受傷太過損肝
多紫黑大為陰盛小為陽

未出多不辯之勿作傷寒治太過者解之

又歌

目澀語聲短

一云氣喘聲多澀

發熱有時涼手耳如冰

冷三關洪且長

又宜發散

石壁經瘡子歌

風髓以為傷寒變麻

小兒瘡子候偏多欬嗽涎潮作久疴發熱發寒

一作驚

如怕物看燈停目眼光多

一驚如羊眼白相遇喉中

自響如鞞軋吐後常添氣不和夢裡發來如急

搐唇紅臉赤脉交多渴水心煩多躁熱耳冷足

冷髮溫和舌上有瘡如粟子定知三日熱來多

此病變成麻子候只須平藥病消磨

此因溫熱毒氣在人至春感寒邪陰陽相錯在府作細赤瘡疹在藏為豆瘡切看手足稍冷尻陰冷腹中痛硬是瘡疹候若投驚藥毒邪內攻瘡不出更服熱藥使瘡靨陷死調氣發散愈

瘡疹未見乃可疎利第三

聖惠斷乳兒患疹豆覺似傷寒面與四肢俱赤壯熱頭痛腰背疼足多厥冷眼睛黃色脉息多洪數絕大不定小便赤大便多秘雖是疹豆未攻皮毛可勻和藏府疎泄逐下若在皮毛微微似出勿疎泄或出太

盛豆穴膿水者可踈利

王氏論瘡疹者莫不以古書說繞覺便與踈利為非以錢氏治以溫涼勿妄下為是蓋兒腸胃嬌嫩若妄取轉內虛熱入能殺人故倒靨而死不知古謂踈利者乃先和節陰陽調治榮衛方利藏府即熱氣漸解又曰嬰兒之性自然陽盛陰微藏府陰陽氣逆大小便多秘不通繞覺是此便與踈利即輕患也若已出即不可踈轉冒嘗使瘡疹出便取轉耶况踈利者輕涼藥微利之如青黛黃連類取轉用峻快藥極下之

如巴豆芒硝類愚醫輒以疎利為取轉得不誤耶况
取轉時曾先和節陰陽調治榮衛乎已大小便不通
乎纔覺之說即瘡疹未見醫者取轉知瘡疹之已出
未出乎又曾知疹豆出即不可疎利之語乎蓋庸醫
見是瘡疹便取轉使瘡疹出快所以多誤錢氏云此
天行病唯用溫涼藥不可妄下及妄攻發亦冒嘗有
此證不得疎利語乎妄下非疎利比至如初虞世猶
以瘡疹比傷寒至陽明亦用利藥不知傷寒至陽明
宜下庸醫既不曉古意又使善醫者即印證其說故

特辯之

聖惠治熱甚發疹豆初發早覺者

黃連去鬚篩散一錢水小盞煎五分去滓不時溫服

波斯青黛如棗核大水調服

痘疹論用溫磨刀水

疹豆論瘡未作膿心膈燥睡不安

黑豆煮汁溫徐徐服

天行瘡豆急預之豆湯

小豆

黑豆

萊豆

各半升

甘草

炙一兩

九升水煮豆熟逐日空心任意飲七日後豆發快

瘡疹初出第四

聖惠未與踈轉急服紫草飲

紫草二兩細剉百沸湯一大盞沃便合定勿令氣

出量兒溫服至一合瘡雖出亦輕

諸方以紫草為先

胡荽酒令疹豆速出

胡荽三兩細切酒二大盞煎沸沃胡荽便合定候

冷去滓微微從頂已下噴背脊及兩腳胷腹遍勿

噴面錢乙云左右常令胡荽能辟汗氣瘡疹出快

瘡疹忌外人及穢觸雖不可受風冷亦不可擁遏
令衣服得中并虛涼所坐卧

生油方兒藏府伏熱毒未成疹豆四肢微熱食物似
減頭髮乾立或額多微熱

生油一小盞入體熱水一小盞旋旋傾入油內以

杖不住手攪

疹豆用楊柳枝

候水盡打勻如蜜夜卧時三

歲內服二蜆殼五七歲三蜆殼十五歲以前半合

大人一二合服良久卧少時服三二服大小便利

四肢熱退疹豆不生

瘡疹已出未出第五

秦承祖治瘡疹漸身熱耳尖脚稍冷或腹痛

蟬蛻廿一個淨末水一盞慢火煎七分去滓量大
小溫服如已出更服三五次冷服即有瘡痕悞服
無害

晉王珉治傷寒時氣熱毒豌豆瘡

樺皮木煎汁溫服

水鑑治豌豆瘡

天麻

甘草各一

髮灰

黃丹

熱各一分

馬牙硝

分三

五色豆

各七粒

黃鹽

一分陶隱居以北海黃鹽草粒粗以作

魚鮮及鹹茹

搗散空心冷水調服一錢利下瘡隙差

有十一味字可疑削

秘錄治斑瘡豌豆瘡

髮灰飲汁服三錢匕

藥性

臘月兔肉作醬食毛煎湯洗毛傳瘡甚良

聖惠犀角散治疹豆瘡及赤瘡

犀角

川大黃炒

桑白皮

釣藤

甘草炙

麻黃去根節 龍膽分半

石膏

苦蔓瓢

黃耆各半

粗散一錢水小盞煎三分去滓溫分三服量加減
瘡退濃磨犀角水塗錢乙治瘡疹太盛令不入眼
名調肝散

博濟治瘡疱未勻透肌解毒必勝散

牛蒡子炒熟杵細末一錢荆芥二穗水一盞煎七
分溫服如吧出更服

養生升麻湯治瘡疹與傷寒類頭痛增寒壯熱疑似
間先與解肌湯已發未發皆可

升麻

白芍藥

乾葛

甘草

炙

等分末二錢水一盞煎七分去滓溫服日三四甚
即連夜服緩急亦可湯點身心煩熱溫服寒多熱
服

茅先生獨勝散

牛蒡子

兩半

白殭蚕

一分

末一錢水六分盞紫草二七寸煎四分連三服豆

便出

張渙安斑散調理瘡疹

川升麻

赤茯苓

羌活

黃耆各一兩

人參

枳殼炒

桔梗

甘草炙各半兩

羅末一錢水一盞紫草薄芎少許煎五分去滓量

兒溫服

紅花子湯平調瘡疹

紅花子

紫草茸各一兩麻黃去根節

升麻各半兩

細末半錢薄芎湯入酒一滴同調

疹豆論葛根散治天行熱氣欲發豆瘡作熱疼宜解肌出汗

乾葛

麻黃

各一兩

石膏

二兩

黃芩

芍藥

桂枝

甘草

各半兩

散四錢水盞半煎八分溫服自汗去麻黃

桔迷小柴胡湯

柴胡

八兩

人參

黃芩

甘草

炙各三兩

半夏

二兩半

粗末五錢水二盞薑二片棗一枚煎一盞溫服嗽

加五味子二兩

竹葉湯

石膏

兩四

知母

兩二

麥門冬

甘草

兩各一

粗末五錢水二盞竹葉一握煎七分溫服

犀角飲

犀角

甘草

兩各半

防風

兩二

黃芩

兩一

粗末五錢水二盞煎一盞溫服

活人書化毒湯

紫草

嫩

升麻

甘草

兩各半

劉如麻豆水二盞糯米五十粒煎一盞溫分服劉氏云楚豆瘡欲出渾身壯熱不思飲食服此內消已出即解全出頭焦三服差

紫艸木通湯

木通

紫草

人參

茯苓

糯米

等分

甘草

炙半之

劉如麻豆四錢七水盞半煎一盞溫服

萬全方

豬膽汁和朴硝塗

董汲治一切風熱中暑驚悸瘡疹欲出多睡嗽盛面赤手足冷發溫壯睡中驚搐不寧脉洪數頭痛嘔吐小便黃赤抱龍丸

膽星

半斤

天竺黃

二兩

朱砂

飛二錢

雄黃

飛半兩

麝

錢一

牛黃

字一

研細滴水丸雞頭大二歲竹葉或薄荷湯化一九白虎湯治豆疱瘡疹斑瘡赤黑出不快及瘡毒餘熱并溫熱病中暑煩躁熱渴

石膏

四兩

知母

半兩

甘草

炙三分

人參

半兩

散二錢水一盞粳米廿粒煎七分溫服不時兒減半服春冬秋寒有證亦服但加棗乳母亦服

劉氏治內蘊邪熱咽膈不利痰涎壅嗽眼赤臉腮項結核癰腫毒聚遍身風疹痺毒赤癰及瘡疹已出未出不透服三錢水一盞煎七分消毒犀角飲子

攻咽痛門

活人書鼠粘子湯同

張氏羌活散治風壅作瘡解熱敗毒

羌活

獨活

川芎

桔梗

蟬蛻

地骨皮

前胡

甘草

炙

柴胡

苦蕒根

天麻炙

荊芥

防風

等分細末一錢水三分薄苛二葉煎二分通口服

大小加減

奪命散

升麻

糯米

紫草

甘草

各半兩

木通

二錢半

劉服一大錢水七分煎四分溫服量加減

瘡疹出不快第六

養生治瘡出不快倒靨

紫草茸

木通

甘草

枳殼炒

等分末二錢水一盞煎七分溫日二服兒量与

錢乙紫草散治發斑疹

釣藤鈎子 紫艸茸

等分細末一字或半錢溫酒調無時

疹豆論脫齒散

人齒脫落者瓷瓶內固濟煨赤末薄苛酒調半錢
良久脉平和毒氣散瘡如粟米錢乙入麝少許

治瘡出不快活血飲

白芍藥末一錢酒調止痛溫湯調

衛生如聖散療斑疹不快欲倒靨黑凹者

赤芍藥末半錢煎葡萄酒冷調下

董汲紫草散治伏熱在胃暴發豆疱瘡疹一切惡候

出不快小便赤澀心腹脹滿

即倒靨門錢
乙四聖散

王氏治歲府蘊熱毒氣薰發肌肉生疹豆喉舌生瘡

毒氣未快懊悶氣喘煩渴多睡精神昏塞

已發未發
門活人書

化毒
湯同

王氏治斑瘡不發

乳香細研猪心血丸櫻桃大水磨一九

吳氏

旋取猪心血調麝少許塗兩手心并唇上即出極妙

趙氏治瘡出不快至聖木星飲

朱砂分一

鬱金兩半

細末一二字量兒入龍腦少許新汲水茶脚調後刺攢猪尾血滴三點入藥服一二時瘡出紅活兒

無他病

鄭愈治麻豆不快紫草膏

紫草

白附子

錢各一

麻黃

去節

甘草

炙各二錢

全蠍

十個

僵蚕

炒二枚

末蜜一两酒半盞入紫草煎數沸和藥丸阜角子

大服一粒紫草湯化續用黃耆散調治

疹後解餘毒門

瘡疹倒靨第七

靈苑龍腦膏治時疾發豌豆及赤瘡子未透心煩狂

躁氣喘妄語或見鬼神

龍腦細研滴猪心血丸如雞頭肉紫草湯化一九服少時心神便定得睡瘡疹發透依常將息仍于小猪尾尖取血三五點研入生腦子少許新水調名猪尾膏錢乙未省溫酒化下

譚氏奪命丹治瘡疹毒氣不散出不快及觸犯黑色者

黑熟牛李子七八月內採盆內研汁生絹裂出滓銀器盛慢火熬膏瓷器收常令透風服一阜子大煎杏膠化人行二十里更進一服瘡疹紅色毒氣

慢錢乙名牛李膏又名必勝膏秋結實黑丸成穗
或無生者乾者為末水熬用每膏二兩研入麝半
錢貯不津器中九篇衛生桃膠半兩牛李生一兩
炒末一錢水七分煎四分溫服

錢乙百祥丸治瘡疹倒靨黑陷

紅牙大戟蔭乾漿水煮軟去骨曝乾復內汁中煮
汁盡焙末水丸如粟服一二十丸研赤脂麻湯下
吐利同無時

藍根散

板藍根

一兩

甘草

炒三分

細末半錢或一錢雄雞冠血三兩點同溫酒少許
食後調上二方無此證勿服

四聖散治瘡疹出不快及倒靨

紫草茸

木通

甘草

炒

枳殼

炒

黃耆

焙

等分粗末一錢水一中盞煎八分溫服無時

張煥治痧疹斑毒狀如蚊蚤所咬若毒盛色黑者宜

山梔湯

兼服宣毒膏

幼幼書 卷十八 集

山梔仁 白蘚皮 赤芍藥 升麻 各一兩

寒水石 甘草 炙各半兩

羅末一錢 水八分 一盞 紫草薄苛少許 煎五分溫

服

宣毒膏治毒盛瘡疹出不快倒靨

獾猪尾血 臘月八月刺一升新瓦盆盛 棟乳香 朱砂 飛各一兩

甘草 馬牙硝 各半兩 腦麝 各一分

未猪血拌用寬舊竹筒一個 底留節入藥密紙數

重繫合筒口通一竅 麻索繫大糞坑屋梁上至清

明取出曝乾入腦麝各一錢研勻滴水丸如皂子
人參湯化

疹豆論化毒散

鬱金

枚一

甘草

分一

水半碗同煮水乾去甘草鬱金為末入生腦子半
錢研勻生猪血研成膏薄苛湯化一錢二服後毒
從手足心出差一法蟬蛻末半錢好腦子一皂子
大猪心血三陪和膏熱酒浸紫草溫化服移時身
發熱瘡毒頓出後依證調治

良方療瘡疹欲發及已發面陷伏不速治毒入藏必
困

臘月豬血瓶盛掛風中令乾半棗大加龍腦大豆
許溫酒調灌醫加萊豆英粉半棗大驗

活人書治瘡疹惡候不快及黑瘡子無比散

朱砂

一兩

牛黃

腦麝

膩粉

各一分

細研兒一字大人半錢水銀少許同小犢豬尾血
三兩滴新汲水調服睡後下如爛魚腸葡萄穗之
類臭涎惡物便安兒妹汁

聚寶斑疹不出反入抵聖丸

臘月老鷄左翅風乾辰日燒灰用中等獐猪鬃上
刺血九雞頭大服一九獐猪尾血溫水同化未效
更服

董汲治瘡疹膿疱惡候危困陷黑救生散

獐猪血

臘月取新五雞或掛屋東方陰乾

馬牙硝

各一兩

鵝砂

朱砂

牛黃

腦麝

各一錢

研極細二歲兒一錢新汲水調大便下惡物瘡
紅色為度

治瘡疹熱毒內攻紫黑色出不快玳瑁散

生玳瑁水磨濃汁一合獭猪心血一皂子同研紫
草濃煎湯調服

張氏理脾虛吐瀉如斑瘡未出醫用冷藥致瘡內伏
不出將此調理如無汗用控心散發後羌活散並已出未
門出此名胃愛散

糯米一兩

乾淡木瓜

分三甘草分一

丁香

廿五粒四

味同炒焦

藿香

紫蘇葉

各一分

碾末一錢粟米棗湯調下

脫殼散

雞抱出殼新瓦上焙去膜研如粉兒斑瘡倒癩不出或藏府糞血糞黑頭瘡昏睡不醒酒調一字塗兒唇令舐或塗風池背上心前或熱湯調喫

化斑散

石膏

煨

知母

焙

等分湯調一字服或塗唇上去頭疼除昏發瘡上二方極妙

莊氏斑瘡倒癩并黑色為鬼瘡

人齒炭火燒灰研細豬尾血調二錢移時再服
治瘡倒靨

臘月大糞燒灰為末入生龍腦少許細研新汲水
服半錢

王氏

牛蒡子炒半兩紫草一分

末一錢入麝少許溫酒調三服愈

又

白花蛇連骨一兩
慢火炙焦

大丁香廿一

末兒服半錢水淡酒調如黑搗者服移時重紅

又

橄欖核中截水磨服

趙氏麻黃湯

麻黃三十寸去節蜜拌炒香紫色水一盞煎六分
服神驗

瘡疹太盛第八

煩喘躁渴附

活人書犀角地黃湯治傷寒溫病應汗不汗內有瘀
血及鼻衄吐不盡內有瘀血面黃大便黑此消瘀血

兼治瘡疹出太盛

犀角

一兩無升麻代

生地黄

半斤

芍藥

三分

牡丹

兩

劉如麻豆服五錢七水盞半煮一盞有熱如狂加黃芩二兩脉大來遲腹不滿自言滿者為無熱不用

疹豆論治瘡未出及雖出燥渴甘草散

大甘草炙末服一二錢水一盞煎六分不時呷少

解利熱毒即止若瘡出遲當服紫草飲

初出門

大人

針兩腕硯子骨間男左女右取灸一壯亦助發毒

已發勿用

麻黃湯治瘡疹煩喘

麻黃

杏仁

桑皮

甘草

炙各一分

劉散藥一兩水七合煎四合溫服若脉數熱未退入竹瀝一半代水煎咽喉痛并嗽入麝少許

瘡疹愛護面目第九

聖惠黃柏膏治疹豆出後即愛護面目勿令沾染先用此塗面後用胡荽酒噴四肢

黃蘗

一兩

萊豆

半兩

甘草

生四兩

癰羅生麻油調薄膏耳前眼唇並厚塗日三五遍
早塗令不生疹豆縱出亦少疹豆論萊豆粉三兩
半

莊氏令瘡疹不入眼

白芥子末水調傳腳心

王氏疹豆初發便煎油滌撒子之類令兒看哺兒忌
醬醋五味馬牛雞戴野味等物止食淡熟猪肉粥
飲餅餌之類入少鹽無害又侵晨人未起時抱
兒井上令投萊莖七粒于井中云使兒斑瘡不入

眠又食熟雞臍等卵未有不損目者雖瘡愈宜數月不食

瘡疹攻咽痛第十

錢乙甘露飲子治心胃熱咽痛口舌生瘡并瘡疹已發未發又治熱氣上攻牙斷腫牙齒動搖

甘草炒

山茵陳葉

石斛

枇杷葉去毛

枳殼炒

黃芩去心

生熟乾地黄焙

天麥門冬焙

等分粗末二錢水一盞煎八分食後溫服齒牙病

并含嗽潔

治瘡疹未出已出或未勻又治一切瘡涼膈去痰咽痛消毒散

牛蒡子

炒二兩

甘草

炒半兩

荊芥穗

一分

粗末三錢水盞半煎一盞溫服不時

活人書如聖湯治瘡疹毒攻咽喉腫痛

桔梗

甘草

生

牛蒡子

炒各一兩

麥門冬

半兩

細末二錢沸湯點細細呷竹葉煎尤妙

鼠粘子湯治疹豆欲出未透皮膚熱氣攻咽喉眼赤

心煩

鼠粘子

炒四兩

荊芥穗

二兩

甘草

炙

防風

各一兩

羅末二錢沸湯點服食後臨卧日三服大利咽膈

化涎止嗽春冬間常服免生瘡癰老幼皆宜

衛生療斑瘡毒攻咽喉音聲不出舌頰生瘡渴逆煩

悶潮熱面赤紫河車散

紫河車

茜草根

貫衆

各一兩

芍藥

甘草

炙各半兩

粗末一錢水七分薑二片煎四分溫服一加牛棗

子一兩

董汲治一切熱毒胃熱發斑消豆疱瘡疹及傷寒入
胃發斑并兒驚癇涎厥走馬急疳熱疳黃瘦喉脾腫
痛及瘡疹毒攻咽喉水漿不下紫雪

黃金

一百兩

寒水石

石膏

各三斤

犀角

羚羊角

各十兩

元參

一斤

沉香

木香

丁香

各五兩

甘草

八兩

升麻

六兩

以咀水五斗煮金至三斗去金入藥再煎至一斗
去滓投芒硝二片半微火煎柳木篦攪候凝入盆

中下朱砂麝各三兩急攪勻候冷貯密器勿見風
服一錢溫水化下兒半錢一字咽喉危急少許乾
嚥

瘡疹大小便不通第十一

赤瀝附

張渙川黃散治瘡斑瘡大小便不通

川大黃

麝炒

川芎

各一兩

甘草

黃芩

微炒

枳殼

麝炒各半兩

羅末一錢水一盞紫草少許煎五分溫服

敗毒牛黃丹治瘡疹出定大便不通瘡出膿汁不乾

牛黃

川大黃

各一兩

粉霜

真珠

各一分

研勻煉蜜丸如黍服十粒人參湯下量兒

董汲治瘡疹欲出胃熱發溫壯氣粗腹滿大小便澀
睡中驚煩渴口舌乾手足微冷多睡時嗽涎實脉沉
大滑數利毒丸

大黃

半兩

膩粉

炒

大青

各一錢

龍腦

朱砂

各半錢

檳榔

生牽牛

各半錢

黃芩

青黛

各一錢一本二錢

研細麵糊丸如黃米每二歲八九生薑蜜水下不

動再服量虛實

劉氏治斑瘡水豆心燥發渴及小便赤色口舌生瘡
通心經通關散

山梔子

炒一分半

大黃

炒一錢

木通

炒

甘草

瞿麥

茯苓

人參

滑石

車前子

炒各一分

地扁蓄

焙半兩

細末服嬰孩一字二三歲半錢四五歲一錢水半

盞燈心煎數沸溫服

瘡疹便膿血第十二

疹豆論薤白湯治瘡疹或下痢赤黃膿血身熱

薤白半盞

豆豉一盞

山梔十枚

水五盞煎薤白爛為度量服

董汲治瘡疹陽毒入胃便血日夜無節腹痛啼哭牛

黃散

牛黃一錢

鬱金一兩

研末一歲兒半錢漿水半盞煎三分和滓溫服日

二量增減

瘡疹膿汁不乾第十三

疹豆論治麻豆瘡子已出太盛發潰膿水粘衣着膚不能轉動疼痛濕爛傳之便乾不成癰痕

牛糞晒乾火煨取心中白者研細綿裹擦瘡處一用烏牛糞一用黃牛糞

淨黃土羅傳

麥麩床上貼卧將息

瘡疹入眼第十四

龍木論治斑瘡入眼外障初患時覺瘡入眼若不思口即疼痛淚出赤澀怕日難開腫便翳如銀色此熱

在肝上衝眼肝膈壅毒成瞖宜秦皮湯洗眼涼肝丸
不宜鍼洗出血點藥挑撥痛定點退瞖藥亦得

惠濟論歌

斑豆纔生眼不開淚流頻有熱橫顙如桃腫赤
如錐痛此疾應知奔眼來因與毒餐同熱麪或
因雞膏與戴災急交製造威靈散百日無踰尚
可回

龍木論涼肝丸

防風

兩二

黃芩

羌薊子

黑參

大黃

知母 各一兩

人參

茯苓 各兩半

末煉蜜九梧子大空心茶下十九

秦皮湯

秦皮 二兩

秦艽

細辛

防風 各一兩

甘草 半兩

末二錢水二盞煎三五沸淋洗眼

聖惠蜜蒙花散治疹豆瘡并無辜氣入眼活人書

治諸毒入眼

蜜蒙花 三兩

青箱子

決明子

車前子 各一

兩

羅耒羊肝一大片切摻藥肝內濕紙裹煨熟空心
量食

譚氏仙靈脾散

仙靈脾

威靈仙

末二錢食後米飲調下兒半錢趙氏治食毒睛突
外

養生治目暴赤腫痛兒斑瘡入眼

蘇子炒

蔓菁子

絹袋盛餅上
蒸焙炒香

甘草炙

木賊去節

等分末沸湯點一錢食後服日三

又方

穀精草

蛤粉

等分末一錢豬肝二兩批開搽藥青竹葉裹麻縷
札定水一碗煮熟收瓷瓶內薰眼候溫食日作不
十日退

錢乙蟬蛻散

蟬蛻一兩

猪懸蹄甲

二兩礞石內鹽
泥固燒存性

研入羚羊角末一分拌勻服一字百日兒半錢溫水或新汲水調日三四夜一二食後服一年外難

治

治瘡疹太盛宜調肝散令不入眼

已出未出門聖惠犀角飲同

治瘡疹入眼

馬屁勃

蛇皮

各半兩

皂角子

十四枚

入小罐鹽泥固濟燒存性研細溫酒調一二錢食

後服

治瘡疹入眼成翳

蟬蛻末水煎葶子肝湯調服二三錢凡豆瘡纔欲
着痂即用酥或面油不住潤可揭即揭不然瘡痂
硬即隱成癰痕

張漢決明丹治疹豆瘡後毒氣入眼

決明子

蜜蒙花

各一兩

青箱子

車前子

川黃連

羚羊角

各半兩

羅細末煮羊肝一具切破同搗一二百下丸如黍
服十粒荊芥湯下食後量與

護目膏截斑入眼

黃蘗蜜炙

萊豆

紅藍花

各一兩 甘草生半兩

羅末脂麻油調如薄膏從耳前眼眥外塗時時用

惠濟威靈散治斑瘡雀目眼生翳

威靈仙

仙靈脾

甘草炙

茯苓

子芩

青箱子

大青

芍藥

大黃蒸

等分細末半錢或一錢獾猪膽

宜肝字

二枚批開搽

藥麻纏米泔煮熟冷喫

良方治豌豆瘡入目痛楚恐傷目

浮萍陰乾肝一二錢羊子肝半個入盞內杖子刺爛投水半合絞肝汁調食後服傷目者十服差神驗

疹豆論蕤仁散

蕤仁

炙

黃芩

梔子仁

黃連

黃蘗皮

川升麻

甘草

炙各一兩

細末二錢水一盞煎六分食後溫服量兒如生醫

兼蜜蒙花散

蜜蒙花散

蜜蒙花

三兩

井泉石

青箱子

決明子

車前子

各一兩

細末同麝仁散各半羊肝一片批開摻藥濕紙裹煨熟空心量力食醫退止

活人書撥雲散治疹豆瘡入眼生醫

桑螵蛸一兩炙焦細研入麝少許服二錢生米泔

調臨卧服

通聖散

白菊花

無甘菊代不如白者

萊豆皮

穀精草

去根

各兩

羅末服一大錢乾柿一個生粟米泔一盞煎候泔盡乾柿去核食不時日喫三枚遠年者半月

劉氏目中痘瘡成瞖

大黃

炒二錢

水銀

半錢

男津唾化水銀為泥入大黃末冷水調塗顙如乾水濕

羚羊角丸治眼昏澀赤脉侵睛淚多作障

羚羊角

黃芩

大黃

芥菜子

各二

錢半

當歸

元參

甘草 炙

木賊

蟬殼

珍珠

決明子

炒各

半兩

荊芥穗

川白芷

蒼朮

米泔浸一

宿焙各二兩

羌活 一兩

末煉蜜丸如彈子食後荊芥湯嚼一九兒斑瘡眼

蟬蛻湯下

莊氏治斑瘡入眼及累黑睛樺皮散

樺皮

頭髮

蛇蛻 各半兩

剉淨器內點火燒煙盡細研服半錢黑豆湯入酒

三滴調日五

又方

黃芩末內臘月黃牛膽中吊北陰中旋九葉豆大
麴湯下五丸三年外不治

善化陶宰方

生鱸血點眼良

丁時發黃芩散

黃芩

山梔子

黃丹

等分末牛蒡子葉汁調塗頂

丁安中蟬退散治斑瘡腎障

蟬蛻

蛇蛻

川升麻

蒺藜炒去角

黃連炒

穀精草

大青艸

仙靈脾

威靈仙

井泉石

各半

朱砂

螺粉各一分

細末半錢一錢蜜水調大小加減

聖惠灸大杼二穴各一壯項後第一椎下兩傍各寸

半陷者中炷如麥

瘡疹後解餘毒第十五

聖惠大黃散治疹豆瘡出盡宜服

川大黃

黃芩

黑參

各半兩

搗羅服一錢水小盞煎五分量溫服疹豆論多山梔

唐氏治疹豆不出或用藥發後餘熱未退渴飲水乃

下血斑疼痛牛蒡散

攻咽門錢乙消毒散以薄荷湯調未出紫草湯

瘡疹後滅癰痕第十六

葉氏傷寒發斑是熱毒所為病折則瘡愈而毒尚未全散故瘡癰雖落癰猶壓或凹凸宜消毒滅癰藥傳之

譚氏療兒面上瘡豆癩

黃明膠慢火炙末溫酒調一錢匕出者服之無癩
未出瀉下

又蜜陀僧細研水調夜塗旦洗

聖惠治熱毒發疹豆瘡初愈宜塗

胡粉

兩一

膩粉

分一

和研入鍊子猪脂拌如膏夜薄塗癩上以漿水洗
去

又方

鷹糞白

一兩

衣中白魚

一枚

細研白蜜調如稀飴塗

又方

牡蠣

煨三兩

土瓜根

一兩

羅夜取二錢白蜜調塗面及瘡癰旦煖漿水洗

滅癰膏

馬齒莧

汁一升

鍊成猪脂

三兩

和慢火熬成膏日夜塗痕上

又方

羊脰

乙具酒乙升浸一宿去筋膜

牛酥

四兩

銀鉚內慢火煎三五沸新絲濾淨器盛夜塗面旦用生甘草一两漿水二大盞煎七八沸溫洗面

又用猪脰一片天鼠二枚製塗同上

又鷓鴣糞二兩臘月猪脂三合調塗

洗方

豉升

羊糞一合

和水一斗煎十沸洗痕

良方滅癰

頻搗去痂勿令隱肌不成癰縱有微血以面膏塗
無苦瘡家勿食雞鴨卵即盲瞳卵白尤速戒之

幼幼新書卷第十八

章焚之劑